


Qualitätsbestimmung von Weiden

Vorgehen

Für extensiv genutzte Weiden kann ein Beitrag für die botanische Qualität und für die Strukturqualität ausgerichtet werden.



Kriterien zur Bestimmung des Strukturbeitrages



Zur Erfüllung der biologischen Qualität der Strukturen müssen folgende Kriterien erfüllt werden:

- Strukturteifläche(n) weisen einen Anteil von mindestens 5% an arten- und dornenreichen Hecken, Feld- und Ufergehölzen oder Sträucher und Gebüschgruppen auf.
- Hecken, Feld-, Ufergehölze oder Sträucher weisen mindestens 5 Arten auf oder bestehen zu mehr als 20% aus dornentragenden Sträuchern.

Als Strukturen gelten die folgenden Elemente:

Ausmasse = Richtwerte*

- Hecken
- Sträucher
- Einzelbäume (> 3 m Wuchshöhe*)
- Feld- und Ufergehölze
- Trockenmauern (Länge > 20 m*)
- Lesesteinhaufen oder Felsen (Fläche > 20 m²*)
- Offene Bodenstellen (flächig, sandig/kiesig)
- Fließgewässer mit natürlicher Ufervegetation (Länge / Umfang > 20 m*)
- Gräben
- Teiche / Tümpel
- Bestockte Flächen in Waldweiden
- Vernässte oder periodisch nicht beweidete Stellen (Fläche > 2 Aren*)

Nicht anrechenbar sind Bestände mit:

- Ackerkratzdisteln
- Grossblättrige Ampferarten («Blacken»)
- Neophyten
- Adlerfarn

Schlüssel zur Bestimmung des Florabeitrages



Liste L / S

Liste L: Alle aufgeführten Arten, für Weiden unterhalb 1000 m ü.M.

Liste S: Alle mit * bezeichneten Arten, für Weiden oberhalb 1000 m ü.M.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ■ Alpenhelm* | ■ Mehlprimel* |
| ■ Arnika* | ■ Mittlerer Wegerich |
| ■ Aufrechte Trespe* | ■ Möhre, Rübli |
| ■ Baldrian | ■ Odermennig |
| ■ Betonie | ■ Orchidee grün/braun* |
| ■ Blutwurz | ■ Orchidee mehrfarbig* |
| ■ Borst. Horstgräser | ■ Orchidee rosa/rot* |
| ■ Buchsblättrige Kreuzblume* | ■ Orchidee weiss* |
| ■ Dost | ■ Pfeifengras |
| ■ Enziane, blau / violett* | ■ Platterbsen gelb |
| ■ Esparsetten* | ■ Primeln, gelb |
| ■ Fetthenne* | ■ Salbei* |
| ■ Fiederzwenke* | ■ Schwalbenwurz* |
| ■ Flaumhafer | ■ Segge, schlaffe* |
| ■ Flockenblumen | ■ Seggen, ohne Behaarte Segge* |
| ■ Gelbes Labkraut* | ■ Silberdistel* |
| ■ Glockenblumen | ■ Sonnenröschen* |
| ■ Habermark | ■ Stängellose Kratzdistel* |
| ■ Hainsimsen | ■ Steinquendel* |
| ■ Hauhechel* | ■ Sterndolden* |
| ■ Hufeisenklee* | ■ Sumpfdotterblume |
| ■ Johanniskraut | ■ Sumpferzblatt* |
| ■ Klappertopf | ■ Teufelskrallen, blau* |
| ■ Knolliger Hahnenfuss* | ■ Thymian* |
| ■ Kohldistel | ■ Trollblume |
| ■ Kreuzblume blau* | ■ Vogelwicke |
| ■ Kreuzlabkraut | ■ Wiesenknopf* |
| ■ Kugelblume* | ■ Wiesenraute* |
| ■ Läusekraut* | ■ Witwenblume/Skabiose |
| ■ Lilien, grossblumig* | ■ Wollgräser* |
| ■ Liliensimse* | ■ Wundklee* |
| ■ Mädesüss* | ■ Zittergras |
| ■ Margerite* | ■ Zypressen-Wolfsmilch* |